

تیوریدازین مینو

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.

راهنمایی های عمومی

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت حساسیت به تیوریدازین یا سایر فنوتیازین ها (کلرپرومازین، تری فلوپرازین، فلوفنازین و پرومتازین) و رنگ ها
- در صورت مصرف داروهای دیگر نظیر بتابلاکرها (مانند پروپرانولول و متوپرولول)، آنتی آریتمی ها (مانند آمیودارون)، آنتی سایکوتیک ها (مانند پیموزاید)، ضدافسردگی ها (مانند فلوکستین) و سیزاپراید
- در صورت ابتلا به بیماری های دیگر مخصوصا بیماری قلبی-عروقی، افزایش یا کاهش فشار خون، سابقه تومور سینه، گلوکوم (آب سیاه چشم)، بزرگی پروستات و زخم های گوارشی

مصرف در بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

این دارو در شیر ترشح می شود و ممکن است باعث بروز خواب آلودگی و اختلالات حرکتی در نوزادان گردد، لذا مصرف آن در شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها

- مصرف این دارو ممکن است سبب کاهش سطح هوشیاری گردد از این رو از رانندگی یا کار با ابزار آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند بپرهیزید.
- در طول درمان با این دارو، مصرف الکل و سایر تضعیف کننده های دستگاه عصبی مرکزی بدون تجویز پزشک ممنوع است.
- در صورت مشاهده علائمی چون تعریق شدید، تغییرات در فشار خون، نامنظم شدن ضربان قلب، سختی عضلات و افزایش غیر طبیعی دمای بدن بیمار را به مراکز درمانی منتقل کنید.
- این دارو ممکن است سبب کاهش فشار خون وضعیتی و در نتیجه ایجاد سرگیجه هنگام برخاستن سریع گردد، لذا از تغییر وضعیت سریع و ناگهانی بدن خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار مصرف این دارو بسته به نوع بیماری و شرایط بیمار باید توسط پزشک تعیین گردد.

در صورت فراموش نمودن یک نوبت دارو اگر نحوه مصرف به صورت یک بار در روز باشد، به محض به یاد آوردن در همان روز میل نمایید در غیر این صورت از دو برابر نمودن مقدار دارو در روز بعد خودداری نمائید.

اگر نحوه مصرف بیش از یک بار در روز باشد، در صورتی که حدود یک ساعت بعد از زمان مصرف، نوبت فراموش شده را به یاد آوردید، آن نوبت را میل نموده و در غیر اینصورت آن نوبت را حذف و دارو را مطابق برنامه منظم روزانه مصرف و از دو برابر نمودن مقدار دارو در نوبت بعد خودداری نمایید.

عوارض جانبی

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته هستند، اگرچه همیشه تمام عوارض ذکر شده در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. همچنین برای کاهش عوارض جانبی، دارو را با غذا، شیر و یا آب میل نمایید. این عوارض عبارتند از:

- خواب آلودگی، تب، گلودرد، تغییرات فشار خون و ضربان قلب، مشکلات تنفسی، تعریق شدید، سختی عضلات، مشکلات حرکتی، پرش عضلات، لرزش اندام ها، حساسیت به نور، خارش، زردی، دل درد، تاری دید، اشکال در بلع یا صحبت کردن

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم و مسمومیت فورا با پزشک خویش تماس حاصل فرمائید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط و نحوه نگهداری

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد (ترجیحا بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)، دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- به تاریخ انقضا توجه و از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا امتناع فرمائید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود .

شرایط بسته بندی

به صورت قرص های روکش دار دارای ۱۰، ۲۵، ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره تیوریدازین هیدروکلراید در جعبه های ۱۰۰ عددی، به همراه بروشور تهیه گردیده است.

References:

- 1- USP DI 2007
- 2- Drug Facts and Comparisons, 2008



info@minoopharma.com

شرکت دارویی مینو
تهران - ایران

www.minoopharma.com