

فلووکسامینو[®] ۵۰

فلووکسامین

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

راهنمایی های عمومی

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت مصرف هرگونه دارو مخصوصا: سیزاپراید، استمیزول، ترفنادین، دیلتیازم، کلوزاپین، تتوفیلین، کافئین، کاربامازپین، وارفارین، مهارکننده های مونو آمین اکسیداز (مانند ترانیل سیپرومین، پرو کاربازین، ایزو کربوکسازید، فورازولیدون، سلژیلین...), بنزودیازپین (مانند آلپرازولام، دیازپام، لورازپام، اکسازپام و...), بتابلوکرها (مانند پروپرانولول، اتنولول،...)، ضد افسردگی ها (مانند فلوکستین، آمی تریپتیلین، ایمی پرامین، ...).
 - در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر مخصوصا بیماریهای کبدی، کلیوی و اختلالات عصبی و تشنج
 - در صورت حساسیت به این دارو و یا مواد جانبی آن.
 - در صورت حاملگی یا شیردهی.

مصرف در بارداری و شیردهی

فلووکسامین جز گروه C می باشد و مطالعات حیوانی نشان دهنده آسیب بر جنین حیوان بوده، اما اطلاعاتی از مطالعه بر جنین انسان در دسترس نیست. این دارو در شیر ترشح می شود. در دوران بارداری و شیردهی حتما طبق دستور پزشک معالج مصرف شود.

هشدارها

- از مصرف همزمان این دارو با سیزاپراید، استمیزول، ترفنادین خودداری نمایید.
- از مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده مونو آمین اکسیداز (ترانیل سیپرومین، پرو کاربازین، ایزو کربوکسازید، فورازولیدون، سلژیلین و...) خودداری نمایید. ضمنا در صورتیکه سابقه مصرف مهارکننده های مونو آمین اکسیداز را داشته اید، باید برای شروع مصرف این دارو حداقل ۱۴ روز از آخرین مصرف آنها گذشته باشد.
- در طول درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری نمایید.
- دوز مصرفی این دارو برای بیمارانی که نارسایی کبدی دارند کمتر از افراد معمولی می باشد.

-مصرف دارو در افراد مسن و اطفال متناسب با وضعیت آنها توسط پزشک معالج تجویز گردد.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف این دارو بسته به نوع بیماری و شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می گردد.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه اکثر این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لکن در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید:

تغییر درخلق و خوی، اشکال دردفع ادرار، گلو درد، ضعف، واکنش های حساسیتی، مشکلات حرکتی و اختلالات کبدی.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی ندارند و پس از چند روز برطرف می گردند، در صورتی که ادامه یافته و یا ایجاد مشکل نمایند پزشک خود را مطلع نمایید. این عوارض عبارتند از:

یبوست، سردرد، خواب آلودگی، بیخوابی، آشفستگی، سرگیجه، بی اشتها، سوء هاضمه، تهوع، خشکی دهان و اسهال خفیف.

مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده بیمار را به مرکز درمانی انتقال دهید.

بعضی از علائم ناشی از مصرف بیش از حد دارو عبارتند از: اسهال و استفراغ، سرگیجه، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب، کما، تشنج، افزایش ضربان قلب و لرزش، خشکی دهان، کاهش فشار خون و فراخ شدن مردمک چشم

شرایط نگهداری

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

بسته بندی

به صورت قرصهای روکشدار خط دار، دارای ۵۰ میلی گرم ماده موثره فلووکسامین مالئات بوده و در بسته های ۳۰ عددی به همراه بروشور ارائه می گردد.



info@minoopharma.com

شرکت دارویی مینو
تهران - ایران

www.minoopharma.com