

# سرترالین مینو

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید .

## راهنمایی‌های عمومی

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :
- در صورت حساسیت به سرترالین یا سایر ترکیبات موجود در دارو
  - در صورت مصرف همزمان این دارو با سایمتیدین، دیازپام، تولبوتامید، وارفارین، کاربامازپین، فنی توفین، سوماترپتان، ترامادول، استمیزول، ترفنادین و دیژیتوکسین
  - مصرف همزمان این دارو با مهارکننده‌های منوآمینواکسیداز (فورا زولیدون، سلژبلین، پرو کاربازین، ...).
  - در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر مخصوصاً اختلالات همراه با تشنج، صرع، اختلال عملکرد کبد و کلیه و مشکلات قلبی
  - در صورت بارداری و یا شیردهی

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی

در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک معالج مصرف شود.

## هشدار

- به علت احتمال ایجاد خواب آلودگی و عدم تمرکز تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند به هوشیاری پرهیز نمایید .
- در صورت مصرف مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز از مصرف سرترالین خودداری نمایید و یا حداقل تا ۱۴ روز پس از قطع آنها از مصرف سرترالین اجتناب کنید.
- در طول درمان با این دارو از مصرف الکل و گریپ فروت خودداری نمایید.
- دارو را بصورت تدریجی قطع کنید و از قطع ناگهانی دارو خودداری نمایید.

## مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف این دارو بسته به نوع بیماری و شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می‌گردد.

دارو یک بار در روز (صبح یا شب، همراه با غذا یا بامعده خالی) مصرف گردد. دوره درمان باید بطور کامل رعایت شود و از مصرف بیش از مقدار تجویز شده باید خودداری شود.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو بلافاصله آن را مصرف نمایید یا با پزشک خود مشورت نمایید و مقدار مصرف بعدی را به هیچ وجه دو برابر نکنید.

## عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه اکثر این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لکن در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید.

سر درد، لرزش، سرگیجه، بی خوابی، خواب آلودگی، پarestزی، خستگی، عصبی شدن، اضطراب، آژیتاسیون، هیپرتونی، گیجی، طپش قلب، درد سینه، گر گرفتگی، بشورات جلدی، خارش، تعریق بیش از حد، خشکی دهان، تهوع، اسهال، مدفوع آبکی، سوء هاضمه، استفراغ، یبوست، تشنگی، نفخ، بی اشتها، درد شکم، افزایش اشتها، اختلال عملکرد جنسی در مردان، تکرر ادرار، شب ادراری، سوزش ادرار و درد های عضلانی.

## مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی انتقال دهید.

## شرایط نگهداری

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و درون جعبه نگهداری کنید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

## بسته بندی

بصورت قرصهای روکش دار حاوی ۵۰ یا ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره سرترالین بوده و در جعبه های ۳۰ عددی تهیه گردیده است.



info@minoopharma.com

شرکت دارویی مینو  
تهران\_ ایران

www.minoopharma.com