

کلوزاپین ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ مینو

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمائید.

راهنمایی های عمومی

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت حساسیت به کلوزاپین یا مواد جانبی همراه آن
- در صورت ابتلا به بیماری های دیگر بخصوص بیماری های قلبی، کبدی، کلیوی، سابقه بروز تشنج، گلوکوم (آب سیاه) و کمبود گلبول های خون و بزرگی پروستات
- در صورت مصرف هم زمان با داروهای دیگر بخصوص داروهای موثر بر سیستم اعصاب (مانند فلووکسامین، کلرپرورمازین، تیوریدازین)، آنتی بیوتیک ها (مانند سیپروفلوکساسین، اریتروماکسیم، کوتریموکسازول و کلرامفنیکل)، داروهای ضد تشنج (مانند کاربامازپین و فنی توئین)، آنتی آریتمی ها (مانند آمیودارون و سوتالول)، متیل دوپا، سایمتیدین، پنی سیلامین، دیگوکسین و وارفارین

مصرف در بارداری و شیردهی

این دارو در گروه B طبقه بندی می شود و مطالعات انسانی کافی و کنترل شده ای در رابطه با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود ندارد.

این دارو در شیر ترشح می شود لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها

- به دلیل احتمال بروز آگرانولوسیتوز در اثر مصرف کلوزاپین، قبل از شروع درمان باید شمارش سلول های خونی صورت گرفته و از طبیعی بودن میزان سلول های خونی و بخصوص لکوسیت ها اطمینان حاصل گردد. همچنین در طول دوره درمان نیز به صورت دوره ای این آزمایش تکرار گردد.
- مصرف این دارو ممکن است سبب کاهش سطح هوشیاری گردد از این رو از رانندگی یا کار با ابزارآلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند بپرهیزید.
- درطول درمان با این دارو، مصرف الکل و سایر تضعیف کننده های دستگاه عصبی مرکزی بدون تجویز پزشک ممنوع است.
- در صورت مشاهده علائم شبهه سرماخوردگی، تب، گلودرد، ایجاد زخم در ناحیه گلو و دهان و یا هرگونه نشانه ایجاد عفونت سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.
- درصورت بروز علائمی مانند احساس خستگی بی دلیل، اختلال در تنفس، درد در قفسه سینه و تب به پزشک خود اطلاع دهید.
- این دارو ممکن است سبب کاهش فشار خون وضعیتی و در نتیجه ایجاد سرگیجه هنگام برخاستن سریع گردد. لذا از تغییر وضعیت سریع و ناگهانی بدن خودداری نمایید.
- در بیماران سالمند مبتلا به دمانس ناشی از داروهای ضد سایکوز احتمال خطر مرگ بیشتر است لذا مصرف کلوزاپین با احتیاط فراوان صورت گیرد.

- دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده مصرف نکنید. همچنین مصرف دارو را بدون مشورت پزشک قطع ننمایید.

تداخلات دارویی

در صورت مصرف هم زمان با داروهای دیگر حتماً با پزشک خود مشورت کنید بخصوص داروهای موثر بر سیستم اعصاب (مانند فلووکسامین، کلرپرورمازین، تیوریدازین، لیتیم کربنات)، آنتی بیوتیک ها (مانند سیپروفلوکساسین، اریتروماکسیم، کوتریموکسازول، کلرامفنیکل)، داروهای ضد تشنج (کاربامازپین، فنی توئین)، آنتی آریتمی ها (مانند آمیودارون، سوتالول)، متیل دوپا، سایمتیدین، پنی سیلامین، دیگوکسین و وارفارین

مقدار و نحوه مصرف دارو

- مقدار مصرف این دارو بسته به نوع بیماری و شرایط بیمار باید توسط پزشک تعیین گردد.

- درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت را مصرف کنید مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت از مصرف نوبت فراموش شده و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. در صورت مصرف نکردن دارو بیش از دو روز، جهت شروع مجدد درمان باید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه تمام عوارض ذکر شده در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از:

- آگرانولوسیتوز، خواب آلودگی، تشنج، سرگیجه، سردرد، خستگی، بی حالی، افزایش ضربان قلب، کاهش یا افزایش فشار خون، تهوع، اسهال یا یبوست، سوزش معده، بی اشتها، احتباس ادرار، تعریق زیاد، ترشح بیش از حد بزاق یا خشکی دهان، علائم خارج هرمی (مانند لرزش، سختی عضلات و بی قراری)

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم و مسمومیت، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل فرمائید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط و نحوه نگهداری

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید.

- به تاریخ انقضا توجه و از مصرف داروهای تاریخ گذشته جداً امتناع فرمائید.

- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرایط بسته بندی

به صورت قرص های دارای ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره کلوزاپین، در جعبه های ۱۰۰ عددی و به همراه بروشور تهیه گردیده است.

References:
1-USP DI ,2007
2-Drug Facts and Comparisons, 2008
3-PDR 69 (2015)

info@minoopharma.com



شرکت دارویی مینو
تهران_ایران

www.minoopharma.com